

SMITTEFAR ved bid af SKOVFLÅTER – 2 sygdomme:


1) Skovflåter smitter med Borellia i alle regioner på kortet, også i Danmark.

Borreliose kan vi ikke vaccinere i mod, men vi kan behandle udbruddet med penicillin eller andet antibiotika.

2) Den 2. sygdom, man kan blev smittet via skovflåter er:

Tick borne encefalitis, også kaldt FSME = **Centraleuropæisk Hjernebetændelse**

STATUS fra SSI 2018: Denne sygdom kan ikke behandles, men det kan vaccineres – 1 voksenvaccine koster ca. 320,-.



Forekomst af hjernebetændelse fra skovflåt

Voksne og unge 16-60 år: 2 doser med 1-3 måneders interval (evt. kun 14 dages interval, hvis hurtig immunisering er påkrævet).

En 3. dosis 5-12 mdr. efter 2. dosis. Revaccination med 1 dosis 3 år efter 3. dosis. Derefter 1 dosis hvert 5. år.

(Voksne > 60 år skal følge voksenprogrammet, man kan ikke vaccineres med mindre end 1 md. interval)

Børn 1-15 år få børnedosering: 2 doser med 1-3 måneders interval (evt. kun 14 dages interval, hvis hurtig immunisering er påkrævet).

En 3. dosis 5-12 mdr. efter 2. dosis. Revaccination med 1 dosis 3 år efter 3. dosis. Derefter 1 dosis hvert 5. år.

Catch up-dosis: Hvis intervallet mellem to doser har været længere end anført ovenfor, gives en enkelt catch up-dosis, hvorefter vaccinationsforløbet kan fortsættes. Bemærk: Ingen data om catch up-dosis for børn < 6 år.